

کانی ویت K₃

مکمل درمانی ویتامین K₃

هر کیلوگرم کانی ویت K₃ حاوی :

ویتامین K ₃	۵۰۰۰	میلی گرم
آنتی اکسیدان	۴۰۰	میلی گرم
کاریر	تا ۱۰۰۰	گرم

عوارض کمبود :

در طیور کمبود ویتامین K₃ موجب کمخونی و تاخیر در زمان لخته شدن خون ، خونریزی زیر جلدی ، اختلال در رشد و نمو استخوان ، افزایش خراشیدگی سنگدان ، کاهش تولید تخم مرغ ، نرمی پوسته تخم مرغ و وجود لکه های خونی در زرده تخم مرغ می گردد .

● تحت شرایط طبیعی بروز علایم کمبود ویتامین K₃ در نشخوارکنندگان گزارش نشده است و عموماً به نظر می رسد ساخت باکتریایی ویتامین K₃ در دستگاه گوارش این حیوانات ، برآورده کننده نیاز آنها به این ویتامین می باشد .

مقدار مصرف :

پیشگیری : یک کیلوگرم کانی ویت K₃ در یک تن خوراک
درمان : برحسب شدت علایم کمبود ، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می یابد .

شماره پروانه ساخت 87-511-V.F.G از سازمان دامپزشکی کشور